

Instrucciones de uso

Por favor lea esta información con atención. Le será útil para aplicar HYLO-DUAL® correctamente.

HYLO-DUAL®

Ectoína e Hialuronato de sodio

Reduce los síntomas de la alergia como el prurito y el ardor. Reduce los síntomas de la inflamación e hidrata los ojos secos estabilizando la película lagrimal.

Colirio estéril, libre de fosfatos y sin conservantes.

¿Qué es HYLO-DUAL®?

HYLO-DUAL® es una solución estéril sin conservantes que contiene 20 mg/ml de ectoína, 0,5 mg/ml de hialuronato de sodio, tampón borato y agua.

¿Para qué se usa HYLO-DUAL®?

HYLO-DUAL® alivia los síntomas de la alergia como prurito y ardor, hidrata la córnea y la conjuntiva y las protege frente a la evaporación excesiva de lágrimas. Esta estabilización de la película lagrimal alivia los síntomas de la inflamación de los ojos irritados.

¿Cuándo debe aplicarse HYLO-DUAL®?

El ardor, el prurito, el lagrimeo, la sensación de cuerpo extraño o de ojo seco son síntomas de hipersensibilidad a ciertas sustancias (p.ej. polen, pelo animal o polvo doméstico) que también se denomina alergia. A menudo éste es un síntoma de que el ojo no tiene la humedad suficiente. Dado que una alergia causa síntomas similares es difícil diferenciar entre ojo seco u ojo alérgico.

En estos casos, HYLO-DUAL® resulta adecuado por su doble mecanismo de acción de la ectoína y el hialuronato de sodio.


HYLO-DUAL® contiene ectoína, que es una sustancia natural obtenida de microorganismos que viven en entornos extremos (p. ej. lagos salados). Para protegerse de esas condiciones ambientales extremas, estos microorganismos sintetizan la ectoína. Sus propiedades específicas son utilizadas en HYLO-DUAL®. La ectoína aumenta la unión del agua a las células de la superficie ocular. Esto forma una barrera fisiológica en la conjuntiva contra las sustancias que actúan como alergénicas. Al mismo tiempo, la ectoína estabiliza la capa lipídica de la película lagrimal que protege contra la excesiva evaporación de las lágrimas.

Asimismo, HYLO-DUAL® contiene hialuronato de sodio, una sustancia fisiológica que se encuentra en el ojo y en otras partes del cuerpo. El hialuronato de sodio tiene la especial propiedad de crear una película humectante, estable y de larga duración en la superficie del ojo, sin tener que enjuagarse rápidamente.

La interacción de la ectoína y el hialuronato de sodio proporciona una lubricación intensa y duradera de la superficie ocular y protege frente a la evaporación de las lágrimas. HYLO-DUAL® alivia los síntomas típicos de prurito y ardor que tienen lugar como reacciones alérgicas producidas por factores ambientales así como reacciones inflamatorias.


¿Cómo debe aplicarse HYLO-DUAL®?

Use HYLO-DUAL® únicamente si el precinto de la caja está intacto antes del primer uso (☒).




Paso 1

Retire el tapón antes de cada aplicación sujetando el tapón con una mano y realizando a la vez un movimiento giratorio con la mano que sujeta el envase. Antes de la primera aplicación, mantenga verticalmente el envase con la punta hacia abajo y presione la base hasta que aparezca la primera gota en la boquilla. Ahora puede proceder a las siguientes aplicaciones.



Paso 2

Mantenga el envase con el gotero hacia abajo, de forma que el pulgar presione el hombro del envase y el resto de los dedos se sitúen en la base.




Paso 3

Apoye la mano con la que está sosteniendo el envase COMOD® sobre la que está libre, tal como se representa.



Paso 4

Incline la cabeza un poco hacia atrás, tire suavemente hacia abajo del párpado inferior y presione con fuerza y rápidamente la base del envase. De esta forma se activa el mecanismo para la liberación de una gota. Gracias a la técnica especial de la válvula del sistema COMOD®, el tamaño y la velocidad de la gota son idénticos, independientemente de la presión que se ejerza. Cierre lentamente los ojos para que el líquido se distribuya de forma homogénea sobre la superficie del ojo.



Paso 5

Tras la aplicación, coloque inmediatamente el tapón. Compruebe que la punta del gotero está seca. Durante la aplicación, evite el contacto de la punta del envase con el ojo o la piel.

El envase de HYLO-DUAL® contiene 10 ml de solución, lo que equivale a 300 gotas aproximadamente. Por razones técnicas, siempre queda un pequeño resto en el envase.

La frecuencia de uso de HYLO-DUAL® no está limitada. Cada envase de HYLO-DUAL® debe ser utilizado por una única persona.

Otras indicaciones a tener en cuenta en la aplicación

En el caso de otro tratamiento médico adicional con colirios, debería cumplirse un intervalo como mínimo de 30 minutos para su aplicación. En ese caso, HYLO-DUAL® deberá ser siempre el último en aplicarse. Sin embargo, las pomadas oftálmicas siempre deben administrarse después de usar HYLO-DUAL®.

Debido a que HYLO-DUAL® no contiene conservantes, puede ser empleado para tratamientos de larga duración. En muy raras ocasiones, se han descrito reacciones de hipersensibilidad como escozor o lagrimeo excesivo, que desaparecieron inmediatamente tras la supresión de HYLO-DUAL®.

HYLO-DUAL® es compatible con lentes de contacto. Después de ponerse las lentes de contacto y antes de aplicar el colirio, se recomienda esperar unos 30 minutos para evitar posibles reacciones de incompatibilidad entre los productos que se utilizan para el mantenimiento de las lentes de contacto e HYLO-DUAL®.

No se dispone de información sobre el uso de HYLO-DUAL® durante el embarazo ni durante el período de lactancia. Si usted está embarazada, cree que puede estarlo o está en período de lactancia pregunte a su médico o farmacéutico antes de usar HYLO-DUAL®.

¿Con qué frecuencia y durante cuánto tiempo puede aplicarse HYLO-DUAL®?

HYLO-DUAL® debería utilizarse de acuerdo a las instrucciones recibidas por su oftalmólogo. En general, los adultos y los niños a partir de 6 años se aplican una gota de HYLO-DUAL® tres veces al día en el saco conjuntival. Si tuviera que aplicar HYLO-DUAL® con más frecuencia (p. ej. más de 10 veces al día) consulte a su oftalmólogo. HYLO-DUAL® es apropiado para tratamientos de larga duración. Sin embargo, si las molestias persisten debe consultar a su oftalmólogo.

¿Cuándo no debe aplicarse HYLO-DUAL®?

HYLO-DUAL® no debe aplicarse en caso de hipersensibilidad a alguno de sus componentes y en niños menores de 6 años.

¿Qué necesita saber sobre la conservación de HYLO-DUAL®?

Conservar a temperatura ambiente.

HYLO-DUAL® puede aplicarse hasta 6 meses después de su apertura.

No aplicar después de la fecha de caducidad ().

Presentaciones disponibles:

Colirio de 10 ml

Mantener fuera del alcance de los niños

Fecha de la información:

03/2017

Fabricante ():

URSAPHARM, Industriestraße, 66129 Saarbrücken, Alemania

Distribuidor:

BRILL PHARMA, S.L.
Munier, 10 - 08022 Barcelona
Tel.: +34 934 170 911

