

Kelador®

Crema en monodosis estéril

Lactoferrina Liposomada
5 x 5 ml

Producto
Sanitario
patentado

brill pharma

Descripción

Las discromías causadas por equimosis y hematomas postoperatorios se caracterizan por una elevada presencia de hierro que, al acumularse en la dermis, desencadena procesos inflamatorios. En las primeras etapas de la insuficiencia venosa crónica, la quelación del hierro acumulado previene los estadios posteriores de la enfermedad. La lactoferrina, un eficaz quelante natural del hierro, potenciada mediante su inclusión en liposomas, favorece la cicatrización y la reducción de la discromía.

Indicaciones

Tratamiento tópico de todas las alteraciones trófico-discrómicas del tejido dermo-epidérmico. Equimosis y hematomas postoperatorios (post-blefaroplastia, etc.), discromías hemosiderínicas post-escleroterapia, prevención de las discromías hemosiderínicas de úlceras venosas hierro-dependientes, úlceras varicosas, úlceras de decúbito, fisuras, quemaduras, cicatrización de heridas, tratamiento post-láser (depilación láser, láser ablativo y no ablativo).

Composición

Poliétilenglicol 400, poliétilenglicol 1500, poliétilenglicol 4000, lactoferrina liposomada, sorbitol, glicerina, alantoina, tocoferol.

Modo de empleo

Cada vez que se aplica Kelador® es necesario limpiar la zona afectada con suero fisiológico. La cantidad y el número de aplicaciones varían en función de las características clínicas de las lesiones y del tiempo de absorción de la crema.

Se recomienda aplicar al menos dos veces al día.

Contraindicaciones

Hipersensibilidad conocida a alguno de los componentes del producto.

Advertencias y precauciones

El uso simultáneo de cremas y/o similares en la misma parte anatómica en la que se aplica el producto puede afectar a su eficacia y seguridad. Después de su uso, no tirar el producto en el medio ambiente. Conservar el producto en su envase original, a temperatura inferior a 25°C, en un lugar seco, alejado de la luz y de fuentes de calor. Mantener el producto fuera del alcance de los niños. No utilizar el producto si el envase está dañado. Sólo para uso externo. No ingerir. En caso de ingestión accidental, consultar a un médico. No utilizar después de la fecha de caducidad.

Distribuido por: BRILL PHARMA, S.L. C/ Munner, 10 - 08022 Barcelona (España)

Fabricante: TDC Technology Dedicated to Care S.r.l. Via Copernico, 38 - 20125 Milano (Italia)



REF ES00587TDCM1

REF ES00587TDCM2c

actualizado el 23/09/2021

STERILE R



Kelador®

Creme estéril em monodoses

Lactoferrina Lipossomada
5 x 5 ml

Dispositivo
Médico
patentado

Brill pharma

Descrição

As discromias causadas por equimoses e hematomas pós-operatórios são caracterizadas por uma elevada presença de ferro que, ao acumular-se na derme, desencadeia processos inflamatórios. Nas fases precoces de insuficiência venosa crónica, a quelação do ferro acumulado previne os estados subsequentes da doença. A lactoferrina, um eficaz quelante natural do ferro, potenciada pela sua inclusão em lipossomas, favorece a cicatrização e a redução da discromia.

Indicações

Tratamento tópico de todas as alterações trófico-discrómicas do tecido dermo-epidérmico. Equimose e hematoma pós-cirúrgico (pós-blefaroplastia, etc.), discromias hemossiderínicas pós-escleroterapia, prevenção das discromias hemossiderínicas de úlceras venosas ferro-dependentes, úlceras varicosas, úlceras de decúbito, fissuras, queimaduras, cicatrização de feridas, tratamentos pós-laser (depilação a laser, laser ablativo e não ablativo).

Composição

Poliétilenoglicol 400, poliétilenoglicol 1500, poliétilenoglicol 4000, lactoferrina lipossomada, sorbitol, glicerina, alantoína, tocoferol.

Instruções de utilização

Sempre que aplicar Kelador® é necessário limpar a zona afetada com soro fisiológico. A quantidade e o número de aplicações variam dependendo das características clínicas das lesões e do tempo de absorção do creme.

Recomenda-se pelo menos duas aplicações por dia.

Contraindicações

Hipersensibilidade conhecida a qualquer um dos componentes do produto.

Advertências e precauções

A utilização simultânea de cremes e/ou similares na mesma parte anatómica em que o produto é aplicado pode afetar a sua eficácia e segurança. Após a sua utilização, não eliminar o produto no ambiente. Conservar o produto na sua embalagem original, a temperatura inferior a 25°C num local seco e ao abrigo da luz e fontes de calor. Manter o produto fora do alcance das crianças. Não utilizar o produto se a embalagem estiver danificada. Apenas para uso externo. Não ingerir. No caso de ingestão accidental, consultar um médico. Não utilize após a data de validade.

Distribuído por: BRILL PHARMA UNIP., LDA Av. D. João II, Lote 1.13.01, Loja L/N, 3º Piso,

Parque das Nações, 1990-078 Lisboa (Portugal)

Fabricante: TDC Technology Dedicated to Care S.r.l. Via Copernico, 38 - 20125 Milano (Itália)



REF ES00587TDCM1

REF ES00587TDCM2c

atualizado em 23/09/2021

STERILE R

